

Topas® 100 EC

Concentrado Emulsionable - EC

Fungicida Agrícola

Registro N° 015-96-AG-SENASA

TITULAR DEL REGISTRO:

Syngenta Crop Protection S.A. Sucursal Perú

Av. Manuel Olguín 335 Of. 808, Urb. Los Granados, Santiago de Surco, Lima, Perú


RUC: 20501511740

1. CARACTERÍSTICAS / BENEFICIOS

CARACTERÍSTICAS	BENEFICIOS
Fungicida sistémico. Topas ® 100 EC es un fungicida con propiedades preventivas y curativas para el control de "oidium" en varios cultivos.	Penetra a los tejitos internos del cultivos 30 - 60 minutos después de aplicado no afectan cercanas a la aplicación no afectan su acción fungicida. Se transporta ascendentemente dentro de la planta por lo que llega a diversos sitios de infección del hongo, lo cual garantiza un control más efectivo de las enfermedades y por lo tanto menores daños al cultivo. Controla las enfermedades sin producir fitotoxicidad al cultivo (distingue entre el patógeno y las células vivas del cultivo), permitiendo que las plantas se desarrolleen sanas y vigorosas.

2. GENERALIDADES

Ingredientes Activos:	Penconazol
Nombre Químico: (IUPAC)*	(RS)-1-[2-(2,4-dichlorophenyl)pentyl]-1 <i>H</i> -1,2,4-triazole
Formulación:	Concentrado Emulsionable
Concentración:	100 g/l de Penconazol
Nombre Comercial:	TOPAS ® 100 EC

Fórmula Estructural:	Penconazol
	
Fórmula Empírica:	C ₁₃ H ₁₅ Cl ₂ N ₃
Peso Molecular:	284.2
Grupo Químico:	Triazol

*IUPAC: International Union of Pure and Applied Chemistry.

3. PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS DE LA FORMULACIÓN

Estado Físico:	Líquido
Flamabilidad:	49 – 53 °C
Densidad de la formula	0.94 – 0.96 g/cm ³

4. TOXICOLOGÍA

MODERADAMENTE PELIGROSO – DAÑINO

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Conservar el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- No almacenar ni transportar juntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Almacenar en un lugar seco, sombreado y ventilado, alejado del calor.
- Evitar almacenar el producto a temperaturas superiores a 35 °C.
- Utilizar ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Despues de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada, los utensilios y equipos de aplicación y báñese con abundante agua y jabón.
- Evitar la ingestión del producto.

- Es moderadamente irritante a la piel y a los ojos por lo que se debe evitar la exposición prolongada del producto con la piel y con los ojos.
- Evite respirar los vapores. No inhalar la nube de aspersión.

PRIMEROS AUXILIOS

Grupo Químico: Triazol

En caso de intoxicación llamar al médico inmediatamente, o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta.

En caso de contacto con la piel Retirar la ropa contaminada y lavar las partes del cuerpo afectadas con abundante agua y jabón, incluso el cabello y debajo de las uñas.

En caso de contacto con los ojos Enjuagarlos con agua limpia durante varios minutos.

En caso de ingestión Administrar repetidamente carbón activado en grandes cantidades de agua. No inducir al vómito.

- Nada debe darse por la boca a una persona inconsciente.
- No hay antídoto específico conocido, aplicar terapia sintomática.
- En caso de emergencia llamar a: CICOTOX: 080013040 o CIPROSQUIM: 080050847.

MANEJO Y DISPOSICION DE DESECHOS Y ENVASES VACIOS

- No disponer con residuos municipales.
- Después de usar el contenido, enjuagar tres veces este envase y verter la solución en la mezcla de aplicación, inutilizar el envase triturándolo o perforándolo y depositarlo en un lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

- Altamente tóxico para peces y organismos acuáticos.
- No contaminar fuentes de agua, lagos, ríos, estanques o arroyos con los restos de la aplicación, sobrantes del producto o envases vacíos.
- En caso de derrame recoger el producto y eliminarlo en un sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

5. PROPIEDADES BIOLOGICAS

ESPECTRO DE ACTIVIDAD

Topas ® 100 EC es un fungicida con propiedades preventivas y curativas para el control de “oidium” en varios cultivos.

MODO DE ACCIÓN

Topas ® 100 EC es un fungicida sistémico que penetra rápidamente (30 - 60 minutos después de la aplicación) en el interior de los tejidos de las plantas tratadas, absorbiéndose por las hojas y traslocándose acropetalmente (ascendientemente) por el xilema.

Bioquímicamente actúa inhibiendo la síntesis del ergosterol, el cual tiene la función de estabilizar la estructura molecular de las paredes celulares de hongos superiores (Ascomicetos, Basidiomicetos y Hongos imperfectos).

La ausencia de ergosterol ocasiona la desaparición de la pared celular y por lo tanto la muerte de las células y del hongo en los tejidos de la planta, impidiendo el desarrollo del patógeno en su fase de incubación, por lo cual su acción es considerada principalmente curativa aun cuando también tiene propiedades preventivas y erradicativas.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Topas ® 100 EC es un fungicida curativo para el control de oídio en varios cultivos. Pertenece al grupo de triazoles, inhibidores de la síntesis del ergosterol.

Topas ® 100 EC debe ser aplicado con un volumen de agua que asegure una buena y uniforme cobertura de las plantas. Para obtener el volumen de agua deseado, se recomienda previamente calibrar el equipo de aplicación provisto de boquillas adecuadas (cónicas).

Preparación del caldo:

Disuelva aparte la dosis de Topas ® 100 EC a utilizar con la cantidad suficiente de agua que permita conseguir una solución uniforme y sin grumos. Agitar bien. Viertase en el tanque del equipo o cilindro de preparación y completar el volumen de agua determinada para la aplicación agitando ó removiendo bien para mantener la suspensión uniforme. En caso utilice un surfactante no iónico, añadaloo al final y vuelva a agitar.

CONSULTE CON SU INGENIERO AGRONOMO

6. CAMPOS DE APLICACION (USOS) Y DOSIS

Cultivo	Blanco Biológico		Dosis (cc / 200L)	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre común	Nombre científico			
Zapallo, Melón, Pepinillo, Sandía Tabaco	Oidium	<i>Erysiphe cichoracearum</i>	100 - 120	3	0.20
Manzano, Peral	Oidium	<i>Podosphaera leucotricha</i>		14	0.10
Melocotonero	Oidium	<i>Sphaeroteca pannosa</i> var. <i>Persicae</i>		14	0.20
Vid	Oidium	<i>Uncinula necator</i>		7	0.20
Fríjol, Vainita, Arveja	Oidium	<i>Erysiphe polygoni</i>		30	0.20
Rosas	Oidium	<i>Sphaeroteca pannosa</i> Var. <i>rosae</i>		7	0.20
Fresa	Oidium	<i>Podosphaera macularis</i>		7	0.01
Mango	Oidium	<i>Oidium mangiferae</i>		30	0.01



FICHA TÉCNICA

Fecha de revisión y
actualización: 18/06/2024

Tomate	Oidium	Oidium balsamii		10	0.20
Papa	Oidium	Oidium sp.		30	0.01
Alcachofa	Oidio	Leveillula taurica	125 - 150	14	0.2
Pimiento	Oidium	Leveillula taurica	150	30	0.20

PC: Periodo de Carencia

LMR: Límite Máximo de Residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Para obtener un control óptimo de **Topas ® 100 EC** debe ser aplicado en forma preventiva o tan pronto se observen los primeros síntomas de la enfermedad. Repetir las aplicaciones a intervalos de 10-15 días o de acuerdo con la presión del patógeno. Para evitar la aparición de resistencia se recomienda no aplicar **Topas ® 100 EC** mas de dos veces consecutivas rotando siempre con productos de diferente modo de acción.

PERÍODO DE REINGRESO:

48 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

Topas ® 100 EC puede ser mezclado con la mayoría de los insecticidas y fungicidas más comúnmente utilizados. En caso de duda, se recomienda efectuar previamente una prueba de compatibilidad física a las dosis recomendadas.

FITOTOXICIDAD

Topas ® 100 EC aplicado en las dosis recomendadas no muestra fitotoxicidad en los cultivos recomendados.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del Registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

TECNOLOGIA QUIMICA Y COMERCIO S.A.

Calle René Descartes No 311
Urb. Santa Raquel 2da Etapa, Ate.
Lima- Perú.
Telf: 612-6565, Fax: 348-1020
R.U.C N° 20307150981

FORMULADO POR:

Syngenta S.A.
Cartagena, Colombia

Los nombres de producto que contengan ®, el logo SYNGENTA y el marco CP FRAME son marcas comerciales de una Compañía del Grupo Syngenta