



## SARNAVET PASTA®

### FICHA TÉCNICA

#### USO VETERINARIO

#### 1. GENERALIDADES:

- a) Nombre comercial: SARNAVET PASTA®
- b) Clase de uso: Antisárnico topical a base de Triclorfón.
- c) Formulación: Pasta para aplicación externa
- d) Composición química:
- |                    |         |
|--------------------|---------|
| Triclorfón         | 1,0 g   |
| Excipientes c.s.p. | 100,0 g |

#### 2. PROPIEDADES FÍSICO – QUÍMICAS:

- a) Aspecto : Pasta, libre de impurezas
- b) Color : Amarillento
- c) Olor : Aromático
- d) Estabilidad en almacén: Estable durante 3 años a partir de la fecha de elaboración bajo condiciones normales de almacenamiento.

#### 3. DESCRIPCIÓN:

SARNAVET PASTA® es un antisárnico externo de uso topical cuyo principio activo es el Triclorfón, altamente efectivo contra los ácaros productores de la sarna.

#### 4. INDICACIONES:

Está indicado para el tratamiento topical de la sarna sarcóptica causada por *Sarcoptes scabiei* en camélidos sudamericanos, ovejas, conejos y perros.



**5. ADMINISTRACIÓN:** SARNAVET PASTA<sup>®</sup> se administra externamente untándolo en las áreas de la piel afectadas por la sarna.

**6. DOSIS:** Aplicar cantidad suficiente de SARNAVET PASTA<sup>®</sup> cubriendo la totalidad de las costras. En costras extensas reforzar la aplicación en los bordes de la herida con la piel sana. De ser necesario repetir la aplicación a los 10 días.

**7. MODO DE ACCIÓN:** El Ticlorfón es una combinación de ésteres fosfóricos. Su mecanismo de acción es por inhibición de la colinesterasa, que es la enzima que metaboliza a la acetilcolina que es una sustancia neurotransmisora. Al combinarse el triclorfón con la enzima impide su acción y por lo tanto se produce una acumulación de acetilcolina a nivel de las sinapsis neuromusculares ocasionando la parálisis y muerte del parásito.

- 8. PRECAUCIONES:**
- a) No utilizar en gatos.
  - b) Use guantes durante la manipulación del producto.
  - c) No comer, fumar ni beber durante su manipuleo y aplicación.
  - d) En caso de contacto accidental lavarse con abundante agua y jabón.
  - e) Eliminar los envases vacíos.
  - f) Mantener lejos del alcance de los niños.

**9. CONTRAINDICACIONES:** Ninguna



- 10. PERIODO DE RETIRO:** No posee
- 11. ANTÍDOTO:** En caso de intoxicación accidental aplicar ATROPINA a razón de 2mg/kg de peso.
- 12. ALMACENAMIENTO:** Almacenar en su envase original bien cerrado, en lugar fresco y seco y protegido de la luz. El producto sometido a la luz directa puede ablandar ligeramente sin que esto afecte sus propiedades acaricidas.
- 13. PRESENTACIÓN:** Sobres de 60g, y Potes de 200g, 400g y 500g.
- 14. FORMULADOR/DISTRIBUIDOR:** **Tecnología Química y Comercio S.A.**  
Av. Separadora Industrial Mz. E, Lote  
12 Urb. Santa Raquel 2<sup>a</sup>. Etapa – Ate  
Telf. 348 –1103 Fax 348-1020  
Lima - Perú