

DINAMIC® 70 WG
HERBICIDA AGRÍCOLA
INFORMACION GENERAL

INGREDIENTE ACTIVO	Amicarbazone
NOMBRE QUIMICO	IUPAC: 4-amino-N-tert-butil-4,5-dihidro-3-isopropil-5-oxo-1,2-4-1H-triazol-1-carboxamida
GRUPO QUIMICO	Triazolinonas
CONCENTRACION Y FORMULACION	700 g/Kg Granulo dispersable (WG)
MODO DE ACCION	Sistémico
FORMULADOR	Arysta LifeScience South Africa / Arysta LifeScience do Brasil Indústria Química e Agropecuária Ltda.
TOXICIDAD	Moderadamente peligroso. Banda toxicológica amarilla. LD ₅₀ Producto comercial: Dermal: > 5000 mg/kg Oral: > 2000 mg/kg
ANTIDOTO	No existe antídoto específico. Tratamiento base
REGISTRO SENASA	PQUA N° 1938-SENASA

PRINCIPALES CARACTERISTICAS

DINAMIC® 70 WG es un herbicida sistémico suelo activo con actividad foliar y radicular aplicado en la Pre-siembra incorporada (PSI) o la Pre-emergencia (PRE) del cultivo y de la maleza, para el control de malezas de hoja ancha, gramíneas anuales y perennes propagadas por semilla. Es un inhibidor de la fotosíntesis.

USOS Y DOSIS

Cultivo	Maleza		Dosis (Kg/Ha)	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Maíz	Gramma china (Gramalote)	<i>Sorghum halepense</i>	0.5-0.8	N.D. (No corresponde por la época y forma de uso)	0.05
	Pata de gallina	<i>Eleusine indica</i>			
	Cadillo	<i>Cenchrus equinatus</i>			
	Verdolaga	<i>Portulaca oleracea</i>			
	Amor seco	<i>Bidens pilosa</i>			
Caña de azúcar	Gramma china (Gramalote)	<i>Sorghum halepense</i>	1.25-1.75	N.D. (No corresponde por la época y forma de uso)	0.15
	Pata de gallina	<i>Eleusina indica</i>			
	Correhuela	<i>Ipomea quinquefolia</i>			
	Verdolaga	<i>Portulaca oleracea</i>			
	Amor seco	<i>Bidens pilosa</i>			

P.C.: Período de carencia **L.M.R.:** Límite máximo de residuos

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACION

Realizar una sola aplicación de Pre-emergencia o Pre-siembra por temporada.

PERIODO DE REINGRESO

No entrar al área tratada antes de 12 horas después de realizada la aplicación.

COMPATIBILIDAD

DINAMIC® 70 WG es compatible con la mayoría de los agroquímicos de uso convencional.

FITOTOXICIDAD

DINAMIC® 70 WG no es fitotóxico si es aplicado a los cultivos recomendados si se sigue las instrucciones indicadas en la etiqueta. Evitar aplicar si existen condiciones de estrés, anegamientos, siembras irregulares o semillas destapadas. Evite sobredosificar y los traslapes.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACION DEL AMBIENTE

- Tóxico para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

©Marca registrada