

FICHA TÉCNICA			
ID: FT-VET CEFTOCIDIN SECADO	Versión: 1.0	Fecha: 26/09/2026	Elaborado por: EA Aprobado por: CA



1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

- 1.1. Nombre comercial** : **CEFTOCIDIN SECADO**
- 1.2. Categoría** : Antibacteriano
- 1.3. Forma farmacéutica** : Suspensión intramamaria
- 1.4. Composición** : Cada 100 mL contiene:
- | | |
|-------------------------------|--------|
| Cefalexina (como monohidrato) | 2 g |
| Neomicina (como sulfato) | 1 g |
| Penicilina G (como procaína) | 6 g |
| Excipientes c.s.p. | 100 mL |
- 1.5. Empresa distribuidora** : Tecnología Química y Comercio S.A.
Calle René Descartes N° 311
Urb. Santa Raquel 2ª Etapa, Ate, Lima – Perú.
Central telefónica: (01) 612-6565
- 1.6. Autorización sanitaria** : Reg. SENASA Perú: F.03.05.I.0560

2. INDICACIONES DE USO

Antimicrobiano de amplio espectro para uso en bovinos. Indicado para el tratamiento de infecciones causadas por gérmenes sensibles que afecten la glándula mamaria de vacas al inicio del periodo de secado.

Su beneficio incluye un efecto profiláctico, ya que previene infecciones durante este periodo y minimiza los riesgos en la próxima lactancia, ejerciendo además una importante acción curativa sobre la mastitis subclínica.

3. DOSIS Y MODO DE EMPLEO

3.1. Vía de administración: intramamaria.

3.2. Instrucciones de preparación:

- Su administración debe realizarse cuando la vaca cese su secreción láctea para entrar a periodo de secado, realizando una meticulosa higiene de los pezones.
- Por tratarse de un producto estéril, el inyector debe retirarse de su envoltorio solo al momento de su aplicación.
- Desechar la tapa de la cánula, introducir la cánula en el pezón y descargar el contenido.
- Se recomienda masajear el pezón hacia su base para favorecer una mejor dispersión del producto.

3.3. Dosis y frecuencia:

- Aplicar una jeringa de 5 mL en cada cuarto.

3.4. Periodo de retiro:

- Carne: no consumir la carne de animales tratados hasta 45 días después del último tratamiento.

Documento controlado. Uso exclusivo comercial. Queda prohibida su reproducción, difusión o modificación sin autorización.

FICHA TÉCNICA			
ID: FT-VET CEFTOCIDIN SECADO	Versión: 1.0	Fecha: 26/09/2026	Elaborado por: EA Aprobado por: CA



- Leche: la leche de animales tratados con este producto no debe destinarse a consumo humano.

4. SEGURIDAD Y TOXICIDAD

- No debe ser manipulado por personas con hipersensibilidad a los betalactámicos.

5. ADVERTENCIAS Y RESTRICCIONES

- No asociar a un suministro sistémico de un antibiótico bacteriostático.
- No administrar por otra vía que no sea la intramamaria.
- El producto no debe ser empleado pasada la fecha de expiración consignada en el envase.
- No tocar la cánula estéril para evitar su contaminación.

6. INFORMACIÓN AMBIENTAL

- El producto no es considerado tóxico para la fauna silvestre, incluida la acuática.

7. TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

7.1. Vida útil: 24 meses.

7.2. Condiciones de almacenamiento:

- Mantener el producto en un lugar fresco y seco, protegido de la luz, rayos UV y calor, entre temperaturas de 15°C y 30°C.
- Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

7.3. Condiciones de transporte:

- Los mismos que de almacenamiento.

7.4. Indicaciones para residuos y disposición final de envase

- Los envases deben ser eliminados de acuerdo con las regulaciones nacionales.

8. PRESENTACIONES REGISTRADAS

Jeringa 5 mL, Caja dispensadora 20 unidades.

Documento controlado. Uso exclusivo comercial. Queda prohibida su reproducción, difusión o modificación sin autorización.