

FICHA TÉCNICA			
ID: FT-VET DESTROYER® TFI	Versión: 1.0	Fecha: 23/03/2026	Elaborado por: EA Aprobado por: CA



1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

- 1.1. Nombre comercial** : DESTROYER® TFI
- 1.2. Categoría** : Antiparasitario interno
- 1.3. Forma farmacéutica** : Suspensión oral
- 1.4. Composición** : Cada 100 mL contiene:
- | | |
|--------------------|-----------|
| Triclabendazole | 12.00 g |
| Fenbendazole | 7.50 g |
| Ivermectina | 0.20 g |
| Cobalto | 100.0 mg |
| Cobre | 50.0 mg |
| Selenio | 20.0 mg |
| Metionina | 0.70 g |
| Lisina | 0.47 g |
| Excipientes c.s.p. | 100.00 mL |
- 1.5. Empresa distribuidora** : Tecnología Química y Comercio S.A.
Calle René Descartes N° 311
Urb. Santa Raquel 2ª Etapa, Ate, Lima – Perú.
Central telefónica: (01) 612-6565
- 1.6. Autorización sanitaria** : Reg. SENASA Perú: F.08.36.N.1059

2. INDICACIONES DE USO

Antiparasitario interno de amplio espectro para uso en bovinos, ovinos, caprinos y camélidos sudamericanos.

Indicado para el tratamiento y control de fasciolosis o distomatosis (en sus formas aguda, subaguda o crónica), así como de nemátodos gastrointestinales, pulmonares y tenias.

Posee un gran poder ovicida y es altamente eficaz contra larvas arrestadas o inhibidas (hipobióticas) de *Ostertagia* spp. resistentes. Además, actúa eliminando *Fasciola hepática*, *Haemonchus* spp., *Trichostrongylus* spp., *Nematodirus* spp., *Cooperia* spp., *Oesophagostomum* spp., *Bunostomum* spp., *Chabertia ovina*, *Lamanema chavezii*, *Graphinema aucheniae*, *Trichuris* spp., *Dictyocaulus* spp., *Moniezia* spp., *Thysanosoma* spp. y *Thysaniezia giardi*.

Asimismo, su combinación con cobalto, cobre, selenio y aminoácidos estimula en el animal la síntesis de vitamina B₁₂, esencial para el mantenimiento de las funciones orgánicas, prevención de la anemia, mejora del nivel reproductivo y aporte de un efecto energizante.

Documento controlado. Uso exclusivo comercial. Queda prohibida su reproducción, difusión o modificación sin autorización.

FICHA TÉCNICA			
ID: FT-VET DESTROYER® TFI	Versión: 1.0	Fecha: 23/03/2026	Elaborado por: EA Aprobado por: CA



3. DOSIS Y MODO DE EMPLEO

3.1. Vía de administración: oral.

3.2. Instrucciones de preparación: el producto viene listo para su administración en las dosis recomendadas para cada especie, debiendo agitarse antes de usar. La dosificación debe realizarse antes y después de las lluvias. En centros de engorde, la dosificación debe realizarse antes del inicio del ciclo de engorde. Se recomienda administrarlo antes de la ingesta de las pasturas.

3.3. Dosis y frecuencia:

- Bovinos: 1mL de DESTROYER® TFI por cada 10 kg de peso corporal.
- Ovinos, caprinos y camélidos sudamericanos: 1 mL de DESTROYER® TFI por cada 12 kg de peso corporal.
- Tabla de dosificación:

VACUNOS		OVINOS, CAPRINOS Y CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS	
Peso vivo (kg)	Dosis (mL)	Peso vivo (Kg)	Dosis (mL)
150	15	20	1.7
250	25	30	2.5
350	35	40	3.3
450	45	50	4.2

- Normalmente, en dosificaciones estratégicas y en centros de engorde, se realiza una sola dosificación.
- Las dosificaciones tácticas se realizan de acuerdo con el nivel de parasitismo que muestren los animales.

3.4. Periodo de retiro:

- Carne: no sacrificar animales para consumo humano hasta 35 días después del último tratamiento.

4. SEGURIDAD Y TOXICIDAD

- El producto posee un amplio margen de seguridad.
- Puede ser administrado en animales de cualquier edad, hembras gestantes y animales altamente parasitados.
- Pueden presentarse reacciones de hipersensibilidad como efecto secundario a la liberación de antígenos por los parásitos muertos.
- En caso de presentarse intoxicación, no existe antídoto; por lo que el tratamiento es solo sintomático.

5. ADVERTENCIAS Y RESTRICCIONES

- No administrar en hembras en periodo de lactación.
- No utilizar en ganado lechero en producción.
- No administrar 28 días antes del parto.

Documento controlado. Uso exclusivo comercial. Queda prohibida su reproducción, difusión o modificación sin autorización.

FICHA TÉCNICA			
ID: FT-VET DESTROYER® TFI	Versión: 1.0	Fecha: 23/03/2026	Elaborado por: EA Aprobado por: CA



6. INFORMACIÓN AMBIENTAL

- Tóxico para organismos acuáticos.
- Debe evitarse contaminar las diferentes fuentes de agua y desagüe con el producto, los restos del preparado o los recipientes utilizados.

7. TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

7.1. Vida útil: 24 meses.

7.2. Condiciones de almacenamiento:

- Mantener el producto en un lugar fresco y seco, protegido de la luz, entre temperaturas de 15°C y 30°C.
- Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.
- No almacenar con alimentos ni medicinas de uso humano o animal.
- Mantener el envase cerrado una vez abierto.

7.3. Condiciones de transporte:

- No transportar con alimentos ni medicinas de uso humano o animal.

7.4. Indicaciones para residuos y disposición final de envase

- Ni el producto ni sus envases constituyen una amenaza para la salud pública, animal o medio ambiente.
- No se requiere de procedimientos especiales para la eliminación de los envases.

8. PRESENTACIONES REGISTRADAS

Frasco de PEAD o PET por 250 mL, 500 mL y 1 L.

Envase plástico 4 L.

Jeringa por 30 mL.

Sachet por 40 mL.

Documento controlado. Uso exclusivo comercial. Queda prohibida su reproducción, difusión o modificación sin autorización.