## 1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

**1.1. Nombre comercial** : **FEBANTEC® 4%**
**1.2. Categoría** : Antiparasitario interno
**1.3. Forma farmacéutica** : Polvo
**1.4. Composición** : Cada 100 g contiene:
Fenbendazol 4 g
Excipientes (aminoácidos, otros) c.s.p. 100 g
**1.5. Empresa distribuidora** : Tecnología Química y Comercio S.A.
Calle René Descartes N° 311
Urb. Santa Raquel 2ª Etapa, Ate, Lima – Perú.
Central telefónica: (01) 612-6565
**1.6. Autorización sanitaria** : Reg. SENASA Perú: F.08.20.N.0659

## 2. INDICACIONES DE USO

Indicado para el tratamiento y control de parásitos internos en cerdos y aves.

En cerdos elimina parásitos gastrointestnales, pulmonares y renales como *Hyostrongylus rubidus*, *Oesophagostomum* spp., *Strongyloides* spp., *Ascaris suum*, *Trichuris suis*, *Metastrongylus* spp. y *Stephanurus dentatus*.

En aves es altamente eficaz contra *Ascaridia galli, Capillaria* spp., *Heterakis gallinarum, Syngamus trachea, Raillietina* spp. y *Davainea proglottina*.

Asimismo, la combinación con aminoácidos ayuda a la pronta recuperación de los animales luego del tratamiento antiparasitario.

## 3. DOSIS Y MODO DE EMPLEO

**3.1. Vía de administración:** vía oral, mezclado en el alimento.
**3.2. Instrucciones de preparación:**

- El producto debe ser mezclado en el alimento para su administración, siguiendo las dosis recomendadas por especie.

**3.3. Dosis, frecuencia, duración tratamiento:**

- **Cerdos:**
  - **Dosificación individual:** 10 g de FEBANTEC® 4% por cada 80 kg de peso vivo, equivalente a 5 mg de fenbendazol/kg de p.v.

| CERDOS | PESO VIVO | DOSIS |
|---|---|---|
| Gorrinos de engorde | 24 kg | 3 g |
| Cerdos | 80 kg | 10 g |
| Cerdas jóvenes | 150 kg | 19 g |
| Cerdas adultas | 200 kg | 25 g |

*Documento controlado. Uso exclusivo comercial. Queda prohibida su reproducción, difusión o modificación sin autorización.*

- **Dosificación masiva (colectiva):**

| CERDOS | CONSUMO DE ALIMENTOS | DURACIÓN DEL TRATAMIENTO | DOSIS POR TONELADA DE ALIMENTO |
|---|---|---|---|
| Destetados en engorde (20 kg p.v. aprox.) | 1 kg/animal/día | 1 día | 2.500 kg |
| | | 5 días | 0.500 kg |
| | | 10 días | 0.250 kg |
| | | 15 días | 0.170 kg |
| Cerdos de 200 kg p.v. aprox. | 2 kg/animal/día | 1 día | 12.500 kg |
| | | 5 días | 2.500 kg |
| | | 10 días | 1.250 kg |
| | | 15 días | 0.830 kg |

- En infestaciones por *Stephanurus dentatus* aumentar la dosis al doble y tratar en un solo día.
- Se recomienda tratar a las cerdas 7 días antes de la monta y repetir el tratamiento a 30 días antes del parto.
- Tratar a los reproductores por lo menos 6 veces al año.
- Si la infestación parasitaria es muy alta, tratar a los animales cada 6 semanas independiente de la edad y peso.

- **Aves**:
  - **Dosis continua:** administrar 125 g/t de alimento terminado.
  - **Dosis en 1 día:** administrar 7.5 kg/t alimento terminado. Se sugiere 6 dosificaciones al año.
  - **Dosis en 3 días:** administrar 2.5 kg/t alimento terminado. Se sugiere 6 dosificaciones al año.
  - **Dosis contra tenias:** administrar 25 kg/t en un solo día.

### 3.4. Periodo de retiro:

- No requiere.

## 4. SEGURIDAD Y TOXICIDAD

- El producto posee un amplio margen de seguridad.
- Pueden presentarse reacciones de hipersensibilidad como efecto secundario a la liberación de antígenos por los parásitos muertos.

## 5. ADVERTENCIAS Y RESTRICCIONES

- No administrar por otra vía que no sea la oral.

## 6. INFORMACIÓN AMBIENTAL

- No desechar por el drenaje.

*Documento controlado. Uso exclusivo comercial. Queda prohibida su reproducción, difusión o modificación sin autorización.*

## 7. TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

### 7.1. Vida útil:

- 36 meses.

### 7.2. Condiciones de almacenamiento:

- Mantener el producto en un lugar fresco y seco, protegido de la luz y humedad, entre 15 °C y 30°C.
- No congelar ni refrigerar.
- Mantener alejado de cualquier fuente de ignición.
- El almacén debe estar equipado con equipo de protección contra rayos.

### 7.3. Condiciones de transporte:

- Transportar separado de sustancias oxidantes y productos comestibles.
- Evitar la insolación, lluvia y altas temperaturas durante el transporte.
- En verano, se recomienda transportarlo por la mañana y por la noche.

### 7.4. Indicaciones para residuos y disposición final de envase

- Luego de utilizar el producto debe destruirse el envase vacío de acuerdo con las regulaciones nacionales.

## 8. PRESENTACIONES REGISTRADAS

Sobre 10 g.
Bolsa 1 kg, 5 kg y 12 kg.

*Documento controlado. Uso exclusivo comercial. Queda prohibida su reproducción, difusión o modificación sin autorización.*